



Trabalho apresentado no 20º CBCENF

Título: AVALIAÇÃO DA PRESENÇA DE SINTOMAS CARACTERÍSTICOS DE DEPRESSÃO PÓS – PARTO ENTRE PUÉRPERAS

Autores: MICHELI BIONDO (Relator)
SILVANA DOS SANTOS ZANOTELLI
ARIANE THAÍSE FRELLO ROQUE

Modalidade: Pôster
Área: Cuidado, Tecnologia e Inovação
Tipo: Monografia

Resumo:

Introdução: A depressão pós- parto (DPP) também caracterizada como um transtorno de humor, tem início no período de 4 a 8 semanas após a gestação e pode ter uma duração de um ano. Cerca de 10 a 20 por cento das mulheres tem DPP, é um problema grave de saúde. **Objetivo:** avaliar a presença de sintomas característicos de depressão pós-parto (DPP) em puérperas a partir da aplicação da Escala de Depressão Pós-natal de Edimburgo - EPDS. E, conhecer o perfil socioeconômico e cultural das puérperas pesquisadas. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa caráter quantitativa descritiva, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade do Estado de Santa Catarina – CEPESH/UDESC, sob parecer número 1.935.273. O estudo foi realizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) Chico Mendes, que pertence ao município de Chapecó-SC. Participaram da pesquisa, mulheres entre 18 e 40 anos de idade, que estavam entre a primeira e oitava semana após o parto e pertenciam a área de abrangência da UBS. A coleta de dados foi realizada a partir de dois questionários, a escala de EPDS e outro questionário abordando questões sociais. Entrevistou-se 20 puérperas; as entrevistas foram realizadas na UBS e em visitas domiciliares. **Resultados:** demonstra um índice baixo de DPP. Este resultado pode estar ligado com o estado social de não vulnerabilidade que estas puérperas se encontravam. **Conclusão:** nesta pesquisa as puérperas entrevistadas não apresentaram risco para o desenvolvimento de DPP, diferente de outros estudos que mostram uma ocorrência mais elevada de DPP. Desta maneira o puerpério se demonstra como um período que merece especial atenção por parte da equipe de saúde, especialmente o enfermeiro, oportunizando a reflexão sobre questões relacionadas a este período, olhando estas mulheres com mais cuidado no que se refere ao seu estado psicológico atentando para um possível surgimento da DPP.