



Trabalho apresentado no 20º CBCENF

Título: INTERFERÊNCIA DAS QUESTÕES SOCIAIS E CLÍNICAS NA CICATRIZAÇÃO DE ULCERAS VASCULOGÊNICAS

Autores: ANDREA PINTO DA COSTA (Relator)
BIANCA MARIA AGUIAR DE OLIVEIRA
DEBORA REIS DOS SANTOS
LEONARDO TELES MARTINS MASCARENHAS
JULYANA DA COSTA LIMA CAVALCANTE
JAIRO EDIELSON RODRIGUES BARBOSA DE SOUSA

Modalidade: Pôster
Área: Cuidado, Tecnologia e Inovação
Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO:As úlceras vasculogênicas(UV) são lesões que representam um desafio para os profissionais de saúde, visto que possui uma alta prevalência.Ela ocasiona impacto negativo na qualidade de vida, na mobilidade, no estado emocional e na capacidade funcional das pessoas acometidas, exigindo atendimento multidisciplinar, com intervenções de natureza local e sistêmica.**OBJETIVO:**Analisar as evidências clínicas sobre a influência das características socioeconômicas, demográficas e clínicas de pessoas com úlceras vasculogênicas.**MÉTODOS:**Trata-se de uma revisão integrativa da qual foi utilizado os seguintes critérios de inclusão: artigos publicados na íntegra; nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde(LILACS) e Scientific Electronic Library Online(SCIELO), que abordavam a temática da úlcera venosa relacionada a enfermagem qualidade de vida, compreendidos no período de 2007 a 2017. Após a aplicação desses critérios, excluiu-se os artigos que não atenderam ao foco da temática da revisão, totalizando ao fim 9 artigos.**RESULTADOS:**Encontrou-se a perturbação no padrão de sono como uma vivência relatada pelas pessoas com UV, quase sempre associada a existência de dor.Além disso, a fadiga e a sensação de cansaço, decorrentes dessas perturbações, são condições que regulamente marcam presença na vida de pessoas com UV e que podem ter consequências na disposição e capacidade das pessoas desempenharem suas atividades pessoais e profissionais.Os resultados reforçam a predominância de úlceras venosas entre as vasculogênicas, com apresentação de lesão única de modo mais frequente, de grande extensão, exsudativas.Sendo que as características do tecido no leito das feridas indicaram comprometimento do processo de cicatrização quando associados a interferências sociais e clínicas.**CONCLUSÃO:**Conclui-se que as associações citadas demonstraram a exposição dos indivíduos a limitações funcionais causada pelas más condições das lesões, o que repercute diretamente no processo de cicatrização. Ademais, os profissionais de enfermagem junto à equipe multidisciplinar devem elaborar estratégias que visem uma melhor qualidade de vida aos pacientes.