



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: COMPORTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO E CLÍNICO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA HEPATOESPLÊNICA EM RECIFE-PE

Autores: GILVANILDO ROBERTO DA SILVA (Relator)
SILVA, GILVANILDO ROBERTO
SILVA, PAULA CAROLINA VALENÇA
DOMINGUES, ANA LÚCIA COUTINHO

Modalidade: Comunicação coordenada

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

Resumo:

A expansão da Esquistossomose da área rural para áreas litorâneas e em periferia de áreas urbanas do Estado de Pernambuco, aponta para uma expansão da endemia com mudanças no seu perfil clínico-epidemiológico. Estudos confirmam que focos da doença vêm surgindo em Recife, em locais de povoamento intenso ou recente, onde se reproduzem as más condições de saneamento. O trabalho descreve os principais aspectos sóciodemográficos e clínicos de portadores da forma grave hepatoesplênica da esquistossomose. Estudo transversal, com 5 pacientes naturais de Recife-PE, atendidos em Hospital Universitário da cidade, de setembro de 2008 a março de 2009. Os casos foram diagnosticados por ultrassonografia de abdome que confirmou fibrose periportal e esplenomegalia. Comprovou-se maior ocorrência da doença entre 31 a 60 anos, com predominância do sexo masculino 60%. A Hemorragia digestiva alta (HDA) esteve presente em 80% dos casos e 60% dos pacientes não realizaram tratamento prévio para hipertensão portal. No entanto, 80% dos indivíduos trataram a esquistossomose previamente com praziquantel. Observou-se a presença da Hepatite C em 14,3% dos indivíduos representando a única co-infecção existente nestes casos. O estudo sugere o aparecimento da forma grave da doença em Recife-PE, onde até o momento, não havia relatos na literatura sobre o aparecimento de casos graves em indivíduos nascidos nestas áreas, bem como, a gravidade destes casos pela alta frequência de episódios de HDA, mostrando a necessidade de vigilância contínua do Programa de Controle de Erradicação da Esquistossomose nesta área.