



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM AMAMENTAÇÃO EFICAZ NO PUERPÉRIO IMEDIATO NA COMUNIDADE

Autores: ANA CLÉIA MARGARIDA TONHÁ (Relator)
 FLAVIANA VIEIRA
 DANIELLE MUNIQUE CAMPUS MARTINS
 MARIANA FANSTONE FERRARESÍ

Modalidade: Pôster
Área: Ensino e pesquisa
Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO: Puerpério ou pós-parto é um período em que a mulher, experimenta modificações ao estado pré-gravídico que se encontrava. Em tal período insere-se a amamentação, que tão logo iniciada influenciará na duração e tipo de aleitamento. O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) proporciona um adequado balanço de nutrientes, não necessitando uso de complementos, sendo ideal para o crescimento e desenvolvimento saudável das crianças. Diante da importância do AME, o enfermeiro deve investir em atividades de visitas domiciliares e fazer uso de instrumentos que identifiquem o diagnóstico relacionado ao conceito de amamentação para o incentivo da prática do AME, a fim de prevenir falhas e aumentar a adesão da puérpera. Neste sentido, a pesquisa mostra a importância de avaliar de forma sistematizada o diagnóstico de enfermagem Amamentação Eficaz durante o puerpério imediato na comunidade. **OBJETIVO:** avaliar o diagnóstico de enfermagem de Amamentação Eficaz no puerpério imediato no contexto da comunidade. **METODOLOGIA:** pesquisa quantitativa, descritiva, transversal e amostra de 30 participantes em uma região de Goiânia- GO. Coleta no domicílio, entre agosto de 2009 e fevereiro de 2010. O roteiro de coleta foi organizado a partir de características definidoras e fatores relacionados do diagnóstico de enfermagem relacionado à Amamentação Eficaz da Taxonomia II da North American Diagnosis Association International (NANDA I,2010). Projeto avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob protocolo de nº 185/07. **RESULTADOS:** 60% das puérperas apresentaram o diagnóstico de Amamentação sendo que alguns fatores relacionados destacaram-se: Idade Gestacional maior que 34 semanas (100%), Confiança Materna (100%) e Fonte de Apoio (83,3%). Os resultados mostraram que o acompanhamento pré-natal nas Unidades de Atenção Básicas de Saúde é fator que influencia na confiança da puérpera durante a amamentação; assim como o apoio dos familiares, permitindo que as puérperas ficassem mais disponíveis para a amamentação. **CONCLUSÃO:** O uso da NANDA permitiu abordagem integral da puérpera, de forma humanizada e sistematizada. O estudo do diagnóstico poderá ampliar o conhecimento da Enfermagem a cerca da amamentação, em especial, no período puerperal imediato domiciliar.