



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: UMA ABORDAGEM DO CONHECIMENTO DOS FATORES RELACIONADOS A CONTAMINAÇÃO DE HPV NO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE

Autores: AMANDA BEZERRA SAMPAIO (Relator)  
MÔNICA VANESSA DE SOUSA COSTA  
NICÁCIA SOUZA OLIVEIRA  
TATIANA ALVES DE OLIVEIRA  
LUANA ALINNY DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE

Modalidade: Pôster  
Área: Ensino e pesquisa  
Tipo: Monografia

Resumo:

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma doença frequentemente transmitida pela via sexual, e é mais prevalente em jovens sexualmente ativos, sendo conhecida também por condiloma acuminado, verruga genital ou crista de galo. Objetivou-se identificar os fatores relacionados à ocorrência do HPV em mulheres atendidas no Centro Microrregional Especializado de Atenção à Saúde Reprodutiva e Sexual (CEMEAR) na cidade de Iguatu-Ce. Utilizou-se como metodologia a abordagem qualitativa, sendo este um estudo do tipo descritivo-exploratório. O período de coleta ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2008. As respostas foram agrupadas em categorias temáticas a partir da leitura e análise acurada dos dados. Dentro desse contexto, participou-se dessa pesquisa 27 mulheres as quais foram analisadas as características do grupo: 27 mulheres com faixa etária de 21 a 40 anos, casadas 13 (48,14%) e solteiras 14 (51,86%), apresentavam escolaridade baixa, renda familiar 07 (25,92%) menor do que 01 salário mínimo; 17 (62,96%) 01 a 02 salários mínimos; 03 (11,12%) 02 a 04 salários mínimos, procedência 21 (77,7%) zona urbana; 06 (22,3%) zona rural. Observou-se o déficit de conhecimento da patologia, 80% dessas mulheres não sabia nada sobre HPV. O estudo evidencia que grande parte das entrevistadas relaciona o HPV com DST's, principalmente a AIDS. Verifica-se que 14 (51,85%) das mulheres realizam o exame anualmente, 05 (18,51%) a cada 06 meses, 03 (11,1%) de 02 em 02 anos e 05 (18,51%) raramente realizam o procedimento. O estudo evidenciou que a maioria das pacientes entrevistadas 17 (62,96%) apresenta HPV com NIC I, 04 (14,81%) HPV sem NIC, 02 (7,4%) NIC II, 01 (3,7%) NIC III e 03 (11,11%) NIC II e III. Evidenciou-se que grande parte das mulheres estudadas, apesar de realizarem tratamento há algum tempo, não sabiam que eram portadoras do HPV. Como forma de prevenção pode-se citar o conhecimento da dinâmica de sua transmissão e prevenção através do uso de preservativos nas relações sexuais. Conclui-se que é necessária a atuação dos profissionais da área de saúde, principalmente enfermeiros, na transmissão de saberes fundamentais para a educação em saúde, uma vez que a maioria dessas mulheres apresentou déficit de conhecimento sobre a doença e que as mesmas foram contaminadas em vida sexual ativa.