



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: QUEIMADURAS: PRINCIPAIS AGENTES CAUSADORES DESSAS LESÕES NO BRASIL

Autores: WELLEN DE LIMA FERNANDES (Relator)  
JOSÉ SAMUEL OLIVEIRA ANDRADE  
KRYRNAH ALLEN DA SILVA MELO  
AYLI MICAELLY MELO  
ROSIMERY CRUZ DE OLIVEIRA DANTAS

Modalidade: Pôster

Área: Ensino e pesquisa

Tipo: Pesquisa

Resumo:

Introdução: Queimaduras são lesões coagulativas causadas nos tecidos, através do contato direto ou indireto do corpo com agentes térmicos. Esse tipo de trauma divide-se em 3 categorias, 1º, 2º e 3º grau. Na queimadura de 1º grau atinge apenas a camada mais superficial da pele causando vermelhidão e dor, a de 2º atinge uma camada mais profunda da pele, causando a formação de bolhas, desprendimento da pele, inchaço e dor, e a de 3º grau atinge as camadas mais profundas da pele, chegando ao tecido composto por gordura e até músculos. Objetivo: Avaliar qual agente apresenta maior incidência no eu se diz respeito a vítimas por queimaduras. Metodologia: Este trabalho teve como fonte principal literaturas pertinentes a cerca da temática, e se procedeu entre o período de 5 de abril a 6 de maio de 2010, sendo realizado através da BVs, Google acadêmico e livros pertinentes acerca da literatura. Resultados: Através de dados colhidos pode ser observado que do total de casos, 71% ocorreram na casa da vítima e 50% envolveram crianças. A água fervente foi responsável por 59% dos acidentes entre as crianças com menos de 3 anos; o álcool utilizado em casa foi responsável por 40% dos acidentes com crianças entre 7 e 11 anos, o grupo mais atingido entre os pacientes pediátricos. Entre os adultos, os pacientes com idade ente 20 e 39 anos foram os mais atingidos (23%); destes, 84% eram do sexo masculino. Dezesete por cento do número total de casos envolveu adultos do sexo masculino em situações de trabalho. Os pacientes adultos do sexo feminino queimaram-se em situações domésticas (67%) e tentativas de suicídio (33%). Setenta e cinco por cento dos pacientes que tentaram o suicídio através da queimadura eram do sexo feminino. Conclusão: Diante do exposto evidenciou-se a importância que é para os enfermeiros traçar estratégias para redução da incidência do trauma térmico deveriam atender a eliminação de fatores de risco no próprio ambiente e a implementação de programas educativos, veiculados principalmente através de meios de comunicação como o rádio e a televisão.