



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: AMAMENTAÇÃO INEFICAZ E RISCO DE AMAMENTAÇÃO INEFICAZ NO PUERPÉRIO DOMICILIAR

Autores: DANIELLE MUNIQUE CAMPOS MARTINS (Relator)
FLAVIANA VIEIRA
ANA CLÉIA MARGARIDA TONHÁ
MARIANA FANSTONE FERRARESI

Modalidade: Pôster
Área: Ensino e pesquisa
Tipo: Pesquisa

Resumo:

INTRODUÇÃO:A qualidade da assistência prestada à mulher no período gravídico refletirá nos problemas apresentados por ela no puerpério, no que diz respeito a conhecimento sobre aleitamento materno, a intervenção do enfermeiro é fundamental para o comportamento que a mulher apresentará neste período. A North American Diagnosis Association International (NANDA-I) padroniza a linguagem do raciocínio clínico do enfermeiro, por meio dos diagnósticos de enfermagem (DE), isto tem contribuído para promover autonomia no do cuidado ao cliente, com finalidade de proporcionar o uso dos conhecimentos específicos da enfermagem e realizar estudos sobre a qualidade do cuidado de enfermagem. Neste sentido, a pesquisa mostra a importância da avaliação sistematizada dos DE relacionados à amamentação ineficaz durante o puerpério imediato, no ambiente da comunidade em que a puérpera está inserida. **OBJETIVO:** Avaliar os diagnósticos de enfermagem de Amamentação Ineficaz e Risco de Amamentação Ineficaz no puerpério imediato no contexto da comunidade. **METODOLOGIA:** Pesquisa quantitativa, descritiva, transversal, e amostra de 30 participantes da região Leste da cidade de Goiânia-GO. Foram realizadas visitas domiciliares para a coleta de dados entre agosto 2009 e fevereiro de 2010, sendo utilizado roteiro elaborado em pesquisa anterior de Vieira (2008), que se baseou nas características definidoras, fatores relacionados e fatores de risco dos DE relacionados a Amamentação Ineficaz e ao Risco de Amamentação Ineficaz e da Taxonomia II da NANDA-I (2010). O projeto desta pesquisa foi avaliado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, sob o protocolo de nº 185/07. **RESULTADOS:** Foi identificado que 23,3% das mulheres apresentaram Amamentação Ineficaz. O Risco para Amamentação Ineficaz esteve presente em 16,7% das puérperas, ambos tendo como principais fatores de risco o déficit de conhecimento sobre amamentação e aleitamento suplementar com mamadeiras. Evidenciou que mesmo o aleitamento materno ser alvo de muitos estudos, ainda é preciso avançar para uma assistência mais efetiva, no sentido de ampliar o conhecimento das puérperas sobre aleitamento materno. **CONCLUSÃO:** A pesquisa permitiu uma visão integral da puérpera inserida no contexto da comunidade, assim como permitiu identificar os fatores que afetam o exercício da amamentação pelas mulheres, embasada no uso da NANDA permitindo abordagem à puérpera, de forma humana e sistematizada.