



Trabalho apresentado no 13º CBCENF

Título: AVALIAÇÃO DA DOR EM PACIENTES HOSPITALIZADOS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS

Autores: DAYSE CRISTINA LIMA OLIVEIRA (Relator)
ARIELI RODRIGUES NÓBREGA VIDERES
TATIANA CRISTINA VASCONCELOS
MARIA NEYRIAN DE FÁTIMA FERNANDES
EMÍLIA FERNANDES PIMENTA

Modalidade: Pôster
Área: Ensino e pesquisa
Tipo: Monografia

Resumo:

Introdução: O grau e a duração da dor que um paciente suporta na trajetória de seu tratamento dependem de fatores como extensão e localização da ferida, estado emocional, nível de ansiedade e de tolerância à dor, experiências anteriores, cultura, faixa etária, humor, medo, estresse, impotência, raiva, insônia e fadiga. **Objetivo:** Avaliar a dor em pacientes hospitalizados para tratamento de feridas. **Metodologia:** Trata-se de um estudo explicativo, com abordagem quantitativa, desenvolvido com 40 pacientes hospitalizados nos setores de Clínica Médica e Cirúrgica dos Hospitais Regionais sediados nos municípios de Sousa e Cajazeiras, estado da Paraíba, no qual se utilizou como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista. A coleta de dados obedeceu a um procedimento padrão a fim de evitar possíveis constrangimentos. Os dados foram analisados de forma descritiva e discutidos à luz da literatura pertinente. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Santa Maria situada no município de Cajazeiras (PB), sob protocolo de nº 01390109. **Resultados:** Em relação ao perfil dos participantes, 45% eram adultos, com idades variando entre a faixa etária de 22 a 41 anos, 62,5% eram do sexo masculino, 57,5% eram casados, 80% adotaram a doutrina católica, 60% cursaram o ensino fundamental como maior grau de escolaridade, 85% possuíam renda familiar de até um salário mínimo, 87,5% encontravam-se hospitalizados há aproximadamente uma semana, 52,5% apresentaram feridas de etiologia patológica caracterizadas como úlceras, sendo os membros inferiores as regiões mais afetadas. Ademais, 90% dos participantes disseram sentir dor, e apenas 10% negaram qualquer sensação dolorosa. Sua intensidade foi mencionada como moderada para 50% da amostra, leve para 22,2%, extrema para 22,2% e excruciante para 5,6%. Verificou-se também que 44,2% dos pacientes queixaram-se de dor ao realizarem qualquer movimento físico; 20,9% relataram sentir dor o tempo todo, e, 13,9% durante a realização do curativo. **Conclusão:** São muitas e variadas as causas da dor, e nesse contexto o enfermeiro não deve subestimar a dor do paciente em função da reação apresentada, mas sim procurar avaliar e intervir nessa situação. Ele deve estar preparado para lidar com a dor do outro e com o fato de que os procedimentos de enfermagem ao serem executados podem potencializar a dor.